

Durée : 4 heures

∞ Baccalauréat S La Réunion 15 juin 2006 ∞

EXERCICE 1

4 points

Commun à tous les candidats

Partie A

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $]1; +\infty[$  par

$$f(x) = \frac{x}{\ln x}$$

1.
  - a. Déterminer les limites de la fonction  $f$  en 1 et en  $+\infty$ .
  - b. Étudier les variations de la fonction  $f$ .
2. Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout entier naturel  $n$ .
  - a. On a tracé la courbe représentative  $\mathcal{C}$  de la fonction  $f$  sur la figure donnée en annexe qui sera rendue avec la copie. Construire la droite d'équation  $y = x$  et les points  $M_1$  et  $M_2$  de la courbe  $\mathcal{C}$  d'abscisses respectives  $u_1$  et  $u_2$ . Proposer une conjecture sur le comportement de la suite  $(u_n)$ .
  - b. Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_n \geq e$  (on pourra utiliser la question 1. b.).
  - c. Démontrer que la suite  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell$  de l'intervalle  $[e; +\infty[$ .

Partie B

On rappelle que la fonction  $f$  est continue sur l'intervalle  $]1; +\infty[$ .

1. En étudiant de deux manières la limite de la suite  $(f(u_n))$ , démontrer que  $f(\ell) = \ell$ .
2. En déduire la valeur de  $\ell$ .

EXERCICE 2

6 points

Commun à tous les candidats


Première partie

Calculer l'intégrale  $\int_0^1 xe^x dx$ .

Deuxième partie

La figure ci-dessous représente une cible rectangulaire OIMN telle que, dans le repère orthonormal  $(O; \vec{OI}, \vec{OJ})$ , la ligne courbe  $\mathcal{C}$  reliant le point O au point M est une partie de la courbe représentative de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = xe^x$ . Cette courbe partage la cible OIMN en deux parties A et B comme l'indique la figure ci-dessous.

Un jeu consiste à lancer une fléchette qui atteint soit l'extérieur de la cible, soit l'une des parties A ou B. On admet que la fléchette ne peut atteindre aucune des frontières de la cible, ni la courbe  $\mathcal{C}$ .



Une étude statistique a montré que la fléchette tombe à l'extérieur de la cible avec une probabilité de  $\frac{1}{2}$  et que les probabilités d'atteindre les parties A et B sont proportionnelles à leurs aires respectives.

1. Démontrer que la probabilité d'atteindre la partie A est égale à  $\frac{1}{2e}$ .  
Quelle est la probabilité d'atteindre la partie B ?
2. On lance de manière indépendante trois fléchettes.
  - a. Soit  $X$  la variable aléatoire qui est égale au nombre de fléchettes ayant atteint la partie A. Définir la loi de probabilité de  $X$ . En déduire la valeur exacte de son espérance mathématique.
  - b. Soit  $E$  l'évènement : « Exactement deux fléchettes atteignent la partie A ». Calculer une valeur approchée au millième de la probabilité de  $E$ .
  - c. Soit  $F$  l'évènement : « les trois fléchettes atteignent la partie B ». Calculer la probabilité de  $F$  (on donnera la valeur exacte).  
Sachant qu'aucune fléchette n'a atteint l'extérieur de la cible, quelle est la probabilité que toutes les trois se trouvent dans la partie B ?
3. On lance cette fois de manière indépendante  $n$  fléchettes.
  - a. Déterminer en fonction de  $n$  la probabilité pour qu'au moins une des fléchettes atteigne la partie A.
  - b. Déterminer le plus petit naturel  $n$  tel que  $p_n \geq 0,99$ .

**EXERCICE 3****5 points****Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité**

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ . L'unité graphique est 2 cm.

On désigne par  $i$  le nombre complexe de module 1 et d'argument  $+\frac{\pi}{2}$ .

On réalisera une figure que l'on complétera au fur et à mesure des questions.

1. Résoudre dans l'ensemble  $\mathbb{C}$  des nombres complexes l'équation  $\frac{z-4}{z} = i$ . Écrire la solution sous forme algébrique.
2. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - 2z + 4 = 0$ . Écrire les solutions sous forme exponentielle.
3. Soient A, B, A' et D les points du plan complexe d'affixes respectives :

$$a = 2, \quad b = 4, \quad a' = 2i \quad \text{et} \quad d = 2 + 2i.$$

Quelle est la nature du triangle ODB ?

4. Soient E et F les points d'affixes respectives  $e = 1 - i\sqrt{3}$  et  $f = 1 + i\sqrt{3}$ .  
Quelle est la nature du quadrilatère OEAF ?
5. Soit  $\mathcal{C}$  le cercle de centre A et de rayon 2. Soit  $\mathcal{C}'$  le cercle de centre A' et de rayon 2.  
Soit  $r$  la rotation de centre O et d'angle  $+\frac{\pi}{2}$ 
  - a. On désigne par E' l'image par la rotation  $r$  du point E. Calculer l'affixe  $e'$  du point E'.
  - b. Démontrer que le point E' est un point du cercle  $\mathcal{C}'$ .
  - c. Vérifier que :  $e - d = (\sqrt{3} + 2)(e' - d)$ . En déduire que les points E, E' et D sont alignés.
6. Soit D' l'image du point D par la rotation  $r$ . Démontrer que le triangle EE'D' est rectangle.

**EXERCICE 3****5 points****Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité**

On complètera la figure donnée en annexe 2 au fur et à mesure des questions, et on la rendra avec la copie.

ABCD est un carré tel que  $(\vec{AB}, \vec{AD}) = +\frac{\pi}{2}$ . Soit I le centre du carré ABCD. Soit J le milieu du segment [CD].

On désigne par  $s$  la similitude directe qui transforme A en I et B en J.

Le but de l'exercice est d'étudier certaines propriétés de la similitude  $s$ . Dans la partie A on utilisera des raisonnements géométriques ; dans la partie B on utilisera les nombres complexes.

**Partie A**

1. Déterminer le rapport et l'angle de la similitude  $s$ .
2. On désigne par  $\Omega$  le centre de cette similitude.  $\Gamma_1$  est le cercle de diamètre [AI],  $\Gamma_2$  est le cercle de diamètre [BJ]. Démontrer que  $\Omega$  est l'un des points d'intersection de  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$ . Placer  $\Omega$  sur la figure.
3. Donner l'image par  $s$  de la droite (BC). En déduire le point image par  $s$  du point C, puis le point K image par  $s$  du point I.
4. On pose  $h = s \circ s$  (composée de  $s$  avec elle-même).

- a. Donner la nature de la transformation  $h$  (préciser ses éléments caractéristiques).
- b. Trouver l'image du point A par  $h$ . En déduire que les points A,  $\Omega$  et K sont alignés.

**Partie B**

Le plan complexe est rapporté à un repère  $(A ; \vec{u}, \vec{v})$  orthonormal direct, choisi de manière à ce que les points A, B, C et D aient comme affixes respectives 0, 2,  $2 + 2i$  et  $2i$ .

1. Démontrer que l'écriture complexe de la similitudes est  $z' = \frac{1}{2}iz + 1 + i$ .
2. Calculer l'affixe du point  $\Omega$ .
3. Calculer l'affixe du point E tel que  $s(E) = A$ . Placer le point E sur la figure.

**EXERCICE 4****4 points****Commun à tous les candidats**

Pour chacune des questions 1, 2, 3 et 4, **parmi les quatre affirmations proposées, deux sont exactes et deux sont fausses**. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et les deux affirmations qu'il pense exactes. Aucune justification n'est demandée. Les quatre questions sont indépendantes et sont notées sur 1 point. Toute réponse juste rapporte 0,5 point. Donner plus de 2 réponses à une question entraîne la nullité de la question.

L'espace est rapporté à un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

1. Soit  $P$  le plan d'équation  $2x + 3y + 4z - 1 = 0$ .
  - a. La distance du point O au plan  $P$  est égale à 1.
  - b. La distance du point O au plan  $P$  est égale à  $\frac{1}{\sqrt{29}}$ .
  - c. Le vecteur  $\vec{n} \left( 1 ; \frac{3}{2} ; 2 \right)$  est un vecteur normal au plan  $P$ .
  - d. Le plan  $Q$  d'équation  $-5x + 2y + z = 0$  est parallèle au plan  $P$ .
2. On désigne par  $P$  le plan d'équation  $2x + y - z = 0$ , et par  $D$  la droite passant par le point  $A(1 ; 1 ; 1)$  et de vecteur directeur  $\vec{u} (1 ; -4 ; -2)$ .
  - a. La droite  $D$  est parallèle au plan  $P$ .
  - b. La droite  $D$  est orthogonale au plan  $P$ .
  - c. La droite  $D$  est sécante avec le plan  $P$ .
  - d. Un système d'équations paramétriques de  $D$  est 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 4t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$
3. On désigne par E l'ensemble des points  $M(x ; y ; z)$  tels que :  $x + y + z = 3$  et  $2x - z = 1$ . Soit le point  $A(1 ; 1 ; 1)$ .
  - a. L'ensemble E contient un seul point, le point A.
  - b. L'ensemble E est une droite passant par A.
  - c. L'ensemble E est un plan passant par A.
  - d. L'ensemble E est une droite de vecteur directeur  $\vec{u} (1 ; -3 ; 2)$ .
4. ABCD est un tétraèdre quelconque. Soit  $P$  le plan passant par A et orthogonal à la droite (BC).
  - a. Le plan  $P$  contient toujours le point D.
  - b. Le plan  $P$  contient toujours la hauteur (AH) du triangle ABC.
  - c. Le plan  $P$  est toujours l'ensemble des points  $M$  de l'espace tels que :


$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}.$$

- d. Le plan  $P$  est toujours le plan médiateur du segment [BC].

ANNEXE 1

À compléter et à rendre avec la copie

Figure de l'exercice 1



**ANNEXE 2**

*À compléter et à rendre avec la copie*

Figure de l'exercice 3

